



# จดหมายข่าว อารักขาพืช


## สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง

หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ๕๖๒๕๐ โทร : ๐๕๓-๕๖๓๐๑๑



### การเกิดพิษของสารกำจัดศัตรูพืช และการปฐมพยาบาล

การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเกษตรกรผู้ใช้ได้ ถ้าใช้ไม่ถูกวิธี ในบางครั้งเมื่อเกษตรกรใช้สารฯ แล้วรู้สึกไม่สบาย ต่างๆ เช่น ปวดหัว วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ เป็นต้น อาจเพราะได้รับพิษจากสารฯ เข้าสู่ร่างกาย สารกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายได้ ๓ ทาง คือ



**ทางผิวหนัง** โอกาสที่สารฯ จะเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง?

- หยิบหรือจับภาชนะบรรจุที่รั่วหรือเปื้อนสารฯ
- ไม่ได้ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนสารฯ
- ใช้ถังฉีดพ่นที่รั่วหรือซึม
- เมื่อควงหรือผสมสารฯ แล้วหกหรือกระเด็นถูกผิวหนัง
- ละอองน้ำยาปลิวมาถูกร่างกายขณะฉีดพ่นสารฯ
- เดินผ่านแปลงที่ฉีดพ่นสารฯ ใหม่ๆ

**ทางปาก** โอกาสที่สารฯ เข้าสู่ร่างกายทางปากเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง?

- สารฯ เข้มข้นกระเด็นเข้าปาก
- กิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ก่อนทำความสะอาดร่างกาย
- ถ่ายสารฯ ลงในภาชนะที่ไม่มีฉลากหรือขวดน้ำดื่ม
- รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารฯ
- เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรก่อนกำหนด
- รับประทานเมล็ดพืชที่คลุกสารฯ
- จงใจดื่มหรือกินสารฯ เข้มข้นเพื่อฆ่าตัวตาย




**ทางจมูก** โอกาสที่จะได้รับสารฯ เข้าสู่ร่างกายทางจมูกเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง?

- ใช้สารฯ ที่ระเหยเป็นไอได้
- หายใจเอา ละอองสารฯ ที่มีขนาดเล็กจากการฉีดพ่น
- ใช้สารฯ ที่เป็นผงหรือฝุ่น

กฎ ๕ ข้อในการป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช

๑. อ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำ
๒. ใช้สารฯ ด้วยความระมัดระวัง
๓. ดูแลรักษาเครื่องพ่นฯ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
๔. ซ้ำระล้างร่างกายทุกครั้งหลังการใช้สารฯ
๕. ใช้อุปกรณ์ป้องกันสารฯ



นายสัญญาชัย ปัญจะเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง